

Neugeborenen-Notfälle

Erstversorgung und Intensivmedizin - Online: Refresher-Fragen

Bearbeitet von
Georg Hansmann

2., vollständig überarbeitete und stark erweiterte Aufl. 2015. Buch. 552 S. Hardcover

ISBN 978 3 7945 2905 6

Format (B x L): 16,5 x 24 cm

Gewicht: 1280 g

Weitere Fachgebiete > Medizin > Klinische und Innere Medizin > Pädiatrie,
Neonatologie

Zu Inhaltsverzeichnis

schnell und portofrei erhältlich bei

The logo for beck-shop.de features the text 'beck-shop.de' in a bold, red, sans-serif font. Above the 'i' in 'shop' are three red dots of increasing size. Below the main text, the words 'DIE FACHBUCHHANDLUNG' are written in a smaller, red, all-caps, sans-serif font.

beck-shop.de
DIE FACHBUCHHANDLUNG

Die Online-Fachbuchhandlung beck-shop.de ist spezialisiert auf Fachbücher, insbesondere Recht, Steuern und Wirtschaft. Im Sortiment finden Sie alle Medien (Bücher, Zeitschriften, CDs, eBooks, etc.) aller Verlage. Ergänzt wird das Programm durch Services wie Neuerscheinungsdienst oder Zusammenstellungen von Büchern zu Sonderpreisen. Der Shop führt mehr als 8 Millionen Produkte.

Tab. 20-1 (Fortsetzung)

Symptome	Verlauf und klinische Zeichen	Verdachtsdiagnosen	Initiale Versorgung
Ikterus	- Kind auffallend müde/somnolent/trinkschwach - Dehydratation - Ethnizität - mütterliche Blutgruppe - starke Prellung - Familienanamnese	- ausgeprägter Ikterus - Rh-Immunsisierung, Rh- oder ABO-Inkompatibilität - Sepsis - Dehydratation - angeborene Metabolismusstörung	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, Lactat, Bilirubin, CRP - Ammoniak (später erweitertes metabolisches Work-up) - Blutkulturen, Blutgruppen, Kreuzblut, direkter Coombs-Test - Volumenexpansion i. v.
muskuläre Hypotonie	- AZ beeinträchtigt - auffallende Fazies oder Dysmorphiezeichen - Hautfarbe - Kind apathisch	- Infektion/Sepsis - Ikterus - Krämpfe - intracerebrale Hämorrhagie - neuromuskuläre oder metabolische Störung [51]	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, Lactat, CRP, Bilirubin - Ammoniak (später erweitertes metabolisches Work-up) - neurologisches Work-up [421] - Schädelsonografie
muskuläre Hypertonie	- AZ beeinträchtigt - auffallende Fazies oder Dysmorphiezeichen - Hautfarbe - auffallende Augenbewegungen (z. B. Abweichung der Augen) - Kind somnolent/apathisch - Änderung des Hautkolorits	- Schmerzen - Krämpfe - neuromuskuläre oder metabolische Störung - intracerebrale Hämorrhagie - metabolische Störung	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, Lactat, CRP, Bilirubin - Ammoniak (später erweitertes metabolisches Work-up) - neurologisches Work-up [421] - Schädelsonografie
Zittrigkeit	- schlecht getrunken - Erbrechen - mütterlicher Diabetes mellitus oder Gestationsdiabetes - Unreife - mütterlicher Drogenabusus	- Hypoglykämie - Hypocalcämie - Hypomagnesiämie - Hypophosphatämie - neonataler Opioidentzug	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, CRP, BB, Elektrolyte einschl. ionisiertes Calcium, Magnesium, Phosphor, Bilirubin - toxikologisches Screening (Mutter und Baby) - neurologisches Work-up [421]

Tab. 20-1 (Fortsetzung)

Symptome	Verlauf und klinische Zeichen	Verdachtsdiagnosen	Initiale Versorgung
aufgeblähtes Abdomen, biliäres Erbrechen	- AZ und Vitalzeichen stabil - Blässe - schlecht getrunken - Abdomen auffällig - Atmung auffällig	Brechreiz, biliäres Erbrechen, intestinale Obstruktion → V. a. (► Kap. 41): - intestinale Stenose/Atresie - Ileus (mechanischer, paralytischer) - nekrotisierende Enterocolitis (NEC) - Volvulus	- venöser Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, CRP, Lactat, Bilirubin - Volumenexpansion i. v. - nasogastrische Sonde, keine orale Ernährung, Glucose-10 %-Infusion i. v. aufrechterhalten - Abdomensonografie [337] - Rö.-Abdomen - Kinderchirurgen konsultieren
blutiger Stuhl	- Stuhl beträchtlich oder gering blutverschmiert - Guajaktest positiv - AZ und Vitalzeichen stabil - schwache periphere Perfusion - schlecht getrunken - auffälliges/aufgeblähtes Abdomen - Analfissur - Oligurie	- intestinale Infektion - nekrotisierende Enterocolitis (NEC) - Volvulus - intestinale Duplikation - Analfissur - Enterovirusinfektion (► Kap. 24) - Koagulationsstörung - Vitamin-K-Defizit - Milchintoleranz	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, CRP, Lactat, Bilirubin - bakterielle und virale Stuhlkulturen - Stuhl auf Rotavirus-antigen und Clostridium difficile prüfen - Enterovirus-PCR - Volumenexpansion i. v. - keine orale Ernährung, Glucose 10 % i. v. - Rö.-Abdomen - Abdomensonografie [337]
Diarrhoe	- Stuhl beträchtlich oder gering blutverschmiert - Guajaktest positiv - AZ und Vitalzeichen stabil - schwache periphere Perfusion - schlecht getrunken - auffälliges/aufgeblähtes Abdomen - Analfissur - Oligurie	- intestinale Infektion (► Kap. 24) - Enterovirusinfektion	- venösen Zugang legen - BGA, BZ, BB, Elektrolyte, CRP, Lactat, Bilirubin - bakterielle und virale Stuhlkulturen - Stuhl auf Rotavirus-antigen und Clostridium difficile prüfen - Enterovirus-PCR - Volumenexpansion i. v. - keine orale Ernährung, Glucose 10 % i. v. - Rö.-Abdomen - Abdomensonografie [337]